庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百三十六

詳校官太醫院思程·表天錫

編修臣倉聖脈覆勘 總校官中書臣朱 鈴

校對官中書臣私外志 腾绿監生臣宋 昺

欽定四車全書 ! **海**州為 治には、自国門であ 回脉蒸其根在心日増煩悶擲 き二すことに 小便赤黄忽忽煩亂喘 根在肾早起則體涼 心長熱蒸盛過傷則內 周王朱楠 撰 Ð

内蒸者必外寒而内熱以手指骨而内熱者其根在五 之時或身腫目赤眼扑不安五日内然亦名血然所名 蒸毒傷肺即吐血也四日肉蒸其根在脾體熱如火煩 一盛之時胸湍注熱兩脇下脹咳嗽胸背疼痛眠卧不安 其根在肺大喘短氣臭口俱乾舌上色白小便如血蒸 數蒸盛之時或變為疳臍下脹痛或利不止三日皮蒸 出足翕翕思水多垂白沫睡即浪言驚恐不安其脉浮 躁無汗心腹脹鼓食即欲嘔小便如血大便秘澀蒸盛

炎之四車全書 ! 熱尿即痛十八大腸蒸臭右孔痛十九三焦蒸生病作 骨蒸齒黑十心蒸舌乾十一脾蒸內焦十二肺蒸鼻乾 臟六腑其人必因熱病後得之骨肉自消飲食無味或 眼白色無事常驚十六胃蒸舌下痛十七小腸蒸下焦 十三腎蒸兩耳乾焦十四膀胱蒸右耳偏焦十五膽蒸 皮躁而無光蒸盛之時四肢無力足跌腫起又有二十 則月經不調三腦蒸頭眩悶熱四髓蒸髓沸熱心昏五 三菜者一胞蒸小便黄赤二玉房蒸男則遗瀝漏精女 普濟方

熱作寒二十肉蒸肌肉消瘦二十一魚蒸即喘息魚二十 治五蒸方夫蒸者乃附蒸熟毒之氣皆是死之漸庸醫 犯而成此疾久蒸不除多致危篤必須早療也 九諸蒸患多因熟病後食牛羊肉油膩或酒或房事觸 二皮茶在筋皮蒸即筋皮攣縮二十三編身蒸體氣熱 不識熱毒形狀或妄稱神祟以相疑或致使蒸盛變為 疳致死者令具各方于後

三飲定四車全書 門 二曰脉蒸 為度 用芒硝水服方寸台再服亦可搖苦麥蜜和為九如 梧子大一服七九日再以米飲送之無忌以體輕涼 日骨蒸 出千 以養筒灌下部中若不利取芒硝一方寸七和冷水合 右切以水四升煮取一升半分為三分用羊胞盛之
岩
参 青箱谷二艾葉 告 治 甘草為一

三曰皮蒸 四日肉蒸 急與芒硝一兩以水一升半和分為三服三日服止 竟以冷水浸手以熨脇問及腋下并胸上及痛處亦 和服之再服忌海藻粉菜 用大黄一两半切如小豆大以水一升浸一宿明旦 絞取汁服五合許微利即止若熱不定亦可服芒 可舉臂指炙側腋下第三筋間腋下空中七壮立止 卷二百三十

五日內蒸出所以言內者以外寒內熱附骨也根在 五臟六腑之中必因患後得之骨肉自消飲食無味 方寸七三以凉體為度

為度 皮燥而無光蒸作之時四肢漸細足肤腫者 用石膏十两研如乳粉法用和服方寸七一再以體凉

欽定四車全書 野 加減青蒿丸 治男子婦人一切勞疾骨菜風氣此樂 名杏仁丸治瘦二名木香丸能治尸注鬼氣九 普濟方

名龍腦九治小兒無辜疳痢五名萬病九治一切虚傷 六名丹砂丸治毒邪疮癖氣等七名青蒿九治男子婦 不敢近被毒蛇惡物所傷爛嚼一九傳之立効 心痛及蟲咬心痛三名犀角丸治時行熱疾瘟疫四 以上五味用新甕子一口以小便浸七日和小便并 人一切勞若常带行山林曠野坑穽塚墓前後鬼神 桃枝半握細握甘草四两青高心三松童子小便三大生地黄豆挺份東引 卷二百三十六

欽定四車全書 小便煉至三升用不津器盛将和後藥 粮大黄焙升麻 便清入釜中以桑柴火煉之以箆攪勿住手 始黃耆 桂去 康福皮去 樂者三五百沸渡 桃仁并去雙仁及桔梗 柳武得 近吳茱萸 一矣天靈盖 無虎骨代貝母去蓝 き済方 二十二 明白本白茯苓去黑地骨

報後有血此名肺熱熱毒氣壅轉成鼻寒聲破胸 疾時行瘴瘴常不能害上氣咳嗽無問涕嚥并乾嗽 疾重日再服通三焦安五臟四時常服永無虚勞之 結痛若不速除當成肺痿勞瘦服此樂五兩其病 右為細末用前小便煎和匀入曰搖五百下如末點 平手足熱如火口生瘡舌爛夜夢不祥口中蛋齒牙 可入煉蜜和九如梧桐子大每食後溫水下三十九 木香二碱犀肉屑一两羚羊肉屑二两 炎定四事全書 來 衝人頭面致眼痛昏熱 心胃躁煩口臭生瘡溫水 **必攻五臟状如藤蘿繞木荣枯不相捨令頸項破損** 如蝦蟆衣櫻桃結異腥臭者右愿歷當發不治根本 痛咽痺服五兩瀝子根本從大腸出如朽筋爛肉又 下二九不過一二兩嬰孩無辜病與大人勞病同為 夫婦人曾服熱樂過度近雖樂盡氣力猶有往往發 便秘澀復不識人不下食新汲水下五十九即瘥士 必死服此數兩當効若患時氣頭痛欲死身熟大 178 普濟方

眼中生膜服之可愈若孩子漸大准大人例服之女 在胎中傷精血致令唇口焦乾或渴或利腹中漸結 八月經不均或前或後多少不定青黑色雜或凝 春加 夏加 漸成勞瘦服一二兩當愈 兩 龍膳 知母 龍骨 柴胡去黃連去損暑炒 石菖蒲 麥門冬去白茯苓去黑

龍膽九 一次之四車全書 四 目溫少食漸漸羸瘦 枳實去種立参 苑 龍膽三柴胡去秦光 治胃 射肝 木香 旋覆花 ・普湾方: 防風去黄芩去黑栀子仁 知母的青蒿 貝母法消石研凝水石 **要多痰氣促頭痛口乾** 馬連鈴 百合 敖冬花 百部

生地黄煎九點加治骨蒸勞疾煩熱口乾頗赤咳嗽 熱盗汗四肢乾瘦宜服 下亦得 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九米飲或 麥門冬去心各 牛膝四兩生乾地黄汁 小便三生乾地黄四桃仁三兩去皮火研如膏 人大教 · 動更熬 卷二百三十六 次定四車全書 ! 鼈甲湯 **炙傳油腻 麵道菜** 子大母服食前以温酒下三十九清粥飲下亦得忌 右為末入麝香研令匀用前搖和五七百好九如桐 香無碳蒸光去的柴胡一兩 去祖欄赤次爷三胡黃連三犀角屑 桔梗去 盛桑根白皮 当赤芍藥 當歸分二麝 积殼鼓炒微龍膽去蘆木香 黄芩 地骨皮 治男子女人骨蒸皮肉消瘦面色姜黄不思 普濟方

坐卧不安發如瘧状女人血風一切勞疾 飲食多咳嗽涕嗎稠稠骨節疼痛憎寒壮熱心腹脹 石麤搖篩每服三錢水一蓋棗一枚劈烏梅一箇生 題甲去裙欄醋及春光去苗土紫苑去土一柴胡 兩詞科勒皮照一兩牡蠣縣麻黄去根犀肉屑 當歸切桔梗炒桑根白皮對大黃炒黃連去桃 知母切升麻 桂去處姜徒 甘草 炙栀子仁 檳榔到木香

欽定四車全書 瀬肝九忠 薑三片同煎三五沸 黄 黄奎 去醋 獭 生五 两地骨皮分赤芍花两一种一种大香或龍脂 用戲 肝 去祖《我不不明天。 白木庭黄苓或赤茯苓三川升麻 方治骨蒸勞熱體瘦煩疼宜服 天靈蓝多分 細 長二 ヨニト 研犀角屑五牛黄 ·蔡兹麥門冬去心 **蘆五** 頭鐵微塗 黄酥 热服不拘時候 黄連三知 阿魏 起 熟 兩 細 鐵五 母点柴 焙五 為超 研鼈甲 九 餓 度裹 煨 胡 雄 兩

青萬丸 味身苦疼陽熱傳盛面色多赤 子大每服不計時候以清粥飲下三十九忌莧菜 以糠頭火燒一夜取出桃杏仁別研如泥別入 以上用童子小便五升瓷瓶盛入藥於內塼搘其底 右為末研了樂令句煉蜜和搖三二百杵九如梧桐 青萬州四甘草州一桃仁 杏仁及兴雙仁 治童子室女骨蒸熟成勞不思飲食食即無 知母 天靈盖多車前子 紫苑去土各

欽定四庫全書 索各一分五心煩躁加地骨皮從神羚年角初患未 **揾眾手為丸如梧桐子大不計時候每日熟水下** 所煎小便濕搖一二千杵如鞭入熟蜜一兩五錢更 右除前四味外為末和桃杏仁同搖一二千下旋 **十九咳嗽加貝母五錢婦人月經不通加牡丹延** 錢麝香 犀角生用屑 景秦艽去 京三稜 當歸切枳殼去粮生地黄焙檳柳對黃連 F と 二丁三十六 判宗胡去續斷谷 獺 胡

指肚黃連九出聖府治骨蒸虚勞傳P 味頭疼口乾涕稠涶粘渇不止者 因麻瘦壮熱或即憎寒腹內冷脹四肢煩疼飲食無 面黄色毛髮焦枯服果便愈 傳諸藏酒下四服即愈腹中有塊及疫 獖猪肚! 炒 鼈甲去裙 兩百部 令熟細切一具童子 令乾檀 提為末知 柳煨桔梗炒蒼大米泔 八大公共 毋 母 两条 浸

欽定四庫全書 加減黃者建中湯此經治男子婦人五勞骨慈 右 神效 空腹溫酒送下二十九 柴胡 白术 胡去地骨皮 十九味搖羅為 防風 桔梗路三人 卷二百三十六 ◆煉露為丸如梧桐子。 頭去 甘草 兩

鼈甲煎九一名青蒿龜甲煎治虚劳骨 弱四肢疾鬼氣癖塊方見婦人 更加黄耆一兩或為末蜜湯調服臨期斟酌 石為散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時候老 食不安五心熱問百節痰疼 宿砂仁錢五猪苓與黃耆 惠力治骨蒸熟勞肺痿咳吸傳屍瘦病盗汗 熟地黄 地骨皮 勞人 類諸 肉豆蔻煨檳柳 · 於定四車全書 童子小便五升好酒一升熬青蒿至二升去蒿入酥 每服十五九至二十九温酒或米食下日三服 右一十六味除麝香酥蜜外搖羅為末用青蒿一 鼈甲去裙 崇胡去苗各甘草炙杏仁 桂去麤皮黃連 當歸的地骨皮 **| 成膏候冷入樂末麝香同和丸如梧桐子** 普牌方 胡黄連名 麝香別研酥三 + 觔

痛惡毒鬼魅一 以上四石樂同搖碎後以金銀共六味 痛 狂易叫走及解諸毒無金石草樂執美 日上人 舶 西 銀 五寒水石 切熱病方 次瘟疫 無線 寒熱 瘧病五尸九注心腹絞 切熱毒脚氣悶亂攻衝煩熱口生 卷二百三十六 磁石 一處以水 滑

於定四車全書 病即取强人服一錢冷水和服以意隨人強弱增損 藥汁相和即內蜀硝五升細研入藥汁慢火同煎手 飛丹碌末三兩麝香末一兩一分同研如粉和勺益 不住攪之可有一斗餘即投於盆器內盛欲凝內水 之二日成霜雪曝乾以新合或餅内蜜封盛貯之有 右除前六味外用水三斗煮取一斗餃去滓淨與前 兩 普濟方 香丽沉香西甘草成

治骨蒸有蟲相傳不絕宜服此方思 熱瘡含如杏核許令消細細嚥之乃止 時淚出自定日三五次夜用亦如之無不効口內 生 赤熱痛者以冷水和之點服大小皆初着微微痛 服乾即仰卧以物榰腰令高使藥向胸腹問若患眼 /脚氣病或曾服金石藥發動毒悶者水和服五分 蓬我茂三龍甲三兩至 上当桂心-兩當歸一蜈蚣 福欄柴胡母五紫花 吳黄去 頭足 動折一枝赤足者易折

飲定四車全書 麥門冬湯 乃心蒸之狀 服忌莧菜 將息小便中亦有病根下或蟲物出如未應隔日再 右細羅為散每服空腹以清粥飲下 心松面無色忘前失後婦人患血風氣者多成此疾 顨 治心中煩熱唯欲露體覆之即煩悶驚 黄枚 去糯 ·普 · 濟 · 方 兩 足桃仁 -雙仁麸炒微一四十九枚去 一錢服後穩卧 十四 黄皮

茯苓湯 曾經吐血者服之尤佳若畏石樂不用紫石英 煎取半盈去滓溫服未瘥再服以瘥為度甚益心力 康過損心吐血心煩多忘失精神或體痒風癣! 右各到如麻豆大每服三錢以水一益半入棗兩枚 紫石英雨 麥門冬去心龍面 皮去土各人参 甘草炙羚羊质屑 治心蒸若心驚悚慄男子因讀書損心氣思 遠志去於神去防風去地骨 石膏各三

欽定四庫全書 胷中氣淌 取一盆去浑服早晚各一服 水一蓋半入藥并生薑半分切大棗三枚劈破同前 右對如麻豆大每服五錢以水二益先煎山澤銀取 柳州各桂去處防風去防己各五甘草於四枳殼 白茯苓去黑麥門冬去心款冬花 妙四两地骨皮去土 治諸骨然久不蹇 獨活去蘆檳

犀角丸 患方治骨蒸勞 乾肚熱 九日二一方有鷄骨無鷄舌香 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服空腹米飲下二 烏梅肉炒知母哈各鷄古香 整枯栝樓根照各 大黄落三黄苓去黑細辛去苗葉各桂去廳 妙柴胡 疾羸瘦晚即面赤手足痰疼 盧頭 地骨皮 紫苑去苗赤 兩腦

飲定四庫全書 麥煎散 肌熱盗汗 前以溫童子小便下三十九忌炙傳熟夷道求 右為末煉蜜和搖三二百杵九如梧桐子大每服食 赤茯苓 柴胡 黄去福欄枳殼兩金醋炙枳殼 治少男室女骨蒸婦人血風攻注四肢口臭 一两甘草 當歸 生地黄 长二百三十! 乾漆生鼈甲既常山 用天靈蓋叶炙令黄雨天靈蓋一兩五歲 恢黄去狼,两麸炒, 石膏兩一 蘆頭 · 雨去相胎 垄 大 兩

骨茲之候男子因五勞七傷或因肺壅或因瘴瘧之後 緣此十候所致因漸瘦損初着盗汗即寒熱往來漸 問男子婦人病後餘熱不除或為勞復小兒問癖病並 有虚汗加麻黄根一两 石為末每服三錢小麥五十粒水煎食後即時服若 即右出若屑口非常鲜赤則結重若加吐痢百無 患疮癖婦人因産後虚勞漏汗寒熱或月閉不通無 加咳嗽面色白兩頰赤如熊脂色團團如錢許大左

龍腦丸 一 飲定四庫全書 澡私菜 九日再以知為度因至和忌猪肉熟麺葱蒜生菜海 石搖篩蜜和九如梧桐子大飲服五九漸加至十 生服此仍得不着後, 青箱子六月六知母 常山 姜鞋 ※勞 藏瘦 面色 褒黄 嘔逆上氣煩悶 5年するトラ 苦零皮分二甘草 多蜀漆 黄連是大黄 栀子仁

柴胡湯 膽力 氣喘急日晚便劇不能飲食方見 柴胡去酯胡黄連 宿小 七炒一两地骨皮三去皮火雙地骨皮三 醋便 炙浸 治骨蒸熟勞 一夜平旦去浑空腹温服 訊手足煩心中 一两秦艽 盛 土知母分三鼈 人青嵩少許 去苗 瘦本類門 两 骨 同煎至

|飲定四車全書 麥門冬飲 悸及四乾虚渴面色姜黄失前忘後婦人血氣衰弱 午再服一方無大黄 石為末煉蜜丸如梧桐子大食後米飲下十五九日 麥門冬去心焙白茯苓去黑人参 龍膽 治心蒸心中煩躁手足熱疫 山栀子仁 普濟方 甘首 一两黄本三分 龍腦

靈蓋飲子 退發如瘧日漸痿黃不能飲食宜服 熱渴躁者入淡竹歷一 **棗二枚劈破同煎取一蓋去淖分温!** 右剉如麻豆大每服五錢以水二盆入山澤銀 一跨各去 雨末二ル 二两甘草成 五五錢塗酥炙鼈甲 惠方治骨蒸四肢疼痛筋脉拘急寒熱 防風去地骨皮去土 合煎服若曾經吐血亦治 去超纖 **塩為水** 一服若大患煩 黄 桃

|飲定四庫全書 人 生地黄飲子出聖治骨蒸身勞煩熱四肢疼痛小便赤 色白者必獲黑者難救忌莧菜 黄宜服 出良久審看手十指節間有毛如藕絲焼之極臭毛 更煎取一益去潭食前分温二服服記衣盖卧至日 右細剉拌勻用童子小便三大蓋從午浸至來日五 生用政心各慈白二並一分政心半 没越炒令微黄柴胡去苗知母 我青高或甘草枚去皮火使仁柴胡五酸知母五青高五甘草 と二百三十六 普済方 え

天靈蓋散 便亦頭痛羸瘦宜服 右細剉和匀每服五錢以童子小便一大益煎至五 分去淖不計時候溫服 生薑或杏仁進仁麸炒微黄地骨皮或赤芍生地黄二朱胡去的葱白五寸香或五甘草五 銭五 治骨蒸勞心膈煩滿身體壯熱唇口乾小 火微黄 崇胡一兩途酥柴胡 去面桑根白皮一 爾鼈

欽定四庫全書 桃枝飲子 嫩枝各一握長七寸散 政五十粒生薑半分葱白! **芝煎七分去滓食前分為二服忌莧菜** 右搖篩為散每服五錢以童子小便一大盈入桃 娥桃枝し捉草柳枝 微三 一致葱白と 炙分 剉久 黄去 惠方治骨蒸勞 去逢福醋 1 襉炙 枝韭白並青蒿 知母 ·普 · 滑 · 方 麥門冬去心青蒿 長七寸豉心合甘草生用一握遊豉心半甘草三分 瘦體痛煩熱宜服 Ŧ 超甘当 生

鼈 鐵粉九出聖治骨茲劳體瘦寒熟宜服 甲猪肝丸 前以粥飲下二十九 右為末煉蜜和搖三二百好九如梧桐子大每於食 不計時候分溫三服 右細剉以童子小便二大盛煎至一大益三分去沒 鐵粉二瀬肝心具安息香」鬼督那一白术 分木 香分柴胡去酯胡黄連二 治骨落唇紅頰赤氣麤口乾禍身壯熱

於定四華全島 柴胡煎九出聖治骨蒸勞頰赤口乾心神煩悶體種 麥門冬煎 恵方治骨蒸勞身體常熟羸瘦皮毛乾枯 候以清粥食調下一匙忌羊血 右以三味汁與小便用慢火同煎稍稠即下研了桃 多虚汗大腸秘澀小便赤黄飲食全少 仁麝香珠砂等更熬令稀稠得所如膏每服不計時 便升桃仁去皮失獎仁 麝香細研碌砂細便三桃仁大者二兩湯浸麝香一錢味 生麥門冬汁 青嵩汁 生地黄汁和一童子 普濟方 一声男水熟

地黄煎 渴寒熱 梧桐子大每於食前以溫酒下三十九溫水下亦得 胡 右細剉入小便内煎至三升去淖更煎如稀錫以柴 童子小便計甘草 ·政心斗糯米 合慈韭白 格 制搖羅為末入前樂煎中和搖三二百件九如 主婦人丈夫血氣勞骨然日漸瘦悴 八十十草矣本政豆升葱白却 卷二百三十六 寸雄鼠糞四十挑柳枝 各

飲定四車全書 地骨皮湯 治五蒸 服之尤妙桃仁湯亦良 器貯之每服一赴漸至三赴成煎桑枝熬煎湯調和 藕汁更煎取三五潰下酥蜜攪勿住手候似稀傷以 右以小便六升煮葱或等取二升放去滓次下地 鐵赤芍藥 地骨皮 白茯苓去黑麥門冬去心柴胡去苗各 甘草溪 普濟方 主

鼈甲湯 白りて 欲飲食 頰赤面黃五心煩躁困倦心忪或多盜汗腹脇有塊不 右麤搗節母服五錢水一益半煎至一益去淳 分温二服 **石飝搖節每服三錢水一盞入烏梅** 鼈甲去視機失胡去站各桔梗炒甘草成五 秦光去站土青蒿二两用童子小便 治男子婦人骨蒸勞氣肌體羸瘦四體無力 鐵名

治骨蒸熟血力 青蒿煎出聖治骨然勞氣四肢羸瘦疼痛 钦定四車全書 晚小便服一小升以蹇為度既長服新作大坑焼 取人屎乾者焼令外黑水中澄清每旦服一小升 方以人尿灰酒服方寸七 升夜以水三升漬之稍稍減服小便用童子者住 童子小便十扇香 美二 写三十六 恨令赶一 两 超 裹

WALLES A DIVINE 石先將青蒿於小便由 末 細滴 研札仁是夷 恵力治骨 熬成膏瓷合中 心两焙五 两 炒去 便童 百杵丸如梧桐 黄尖細雙 血炙乾地骨皮 一湯 鐵兩黄 炙二 微兩 去三 鐵兩 黄塗 大記日事 心馬 團魚丸出經驗治骨蒸潮熱咳吸 及骨更煮一盛和藥為九如梧子大每服三十九煎 黄耆湯空心下病安仍服局方黄耆益損湯補理須 取肉連汁食之却將前樂焙乾為末就用團魚裙甲 右前樂同團魚煮候魚熟提起團魚除去魚頭不用 食前煎麥門冬湯下二十九 貝母 店中自死團魚 前胡 知母 普濟方 柴胡各等團魚 盂 箇

金少口匠 過調下 近宜服 右細羅 前用青蒿汁半 阿魏 **桃仁**雙仁 輕炒微 恵方治骨 ALTER STREET 二錢每於食前服以糖利為度 熟分為超 末聚 合生薑汁半合童子小便三 煨 黄皮 卷二百三十六 錢和桃仁更研令匀每服 火 炒帽 两

次定四事 全事 地骨皮散出仁治骨蒸 服 **毎服不計時候以粥飲調下一茶匙忌猪肉** 右細羅為散以童子小便五大益浸一宿慢火 右改咀每服三錢以水一盆生薑三片妻子一箇煎 地骨皮 靈蓋二兩五鐵塗 黄連一兩紫苑一兩洗甘草三分炙青相子一天 黄耆 人参 普濟方: 鼈甲酒浸及甘草谷等 Ī

地德散此經治骨然肌熱一切虚煩 至七分去滓空心卦時服 右為細末每服二錢水一盞生薑三片淡竹葉 北地骨皮 同煎至七分去洋温服 治虚勞骨蒸咳嗽聲嗄皮毛乾枯四肢倦 时作潮熱飲食減少日漸瘦弱 防風番 卷二百三十六 免包里全島 門 柴胡梅連散一名前胡散治骨蒸勞久而不痊三服除 右改咀每服八錢童子小便二益猪膽一箇猪骨髓 根効如神及五勞七傷虛弱皆治 右為末每服二錢水一盆薑三片棗一枚煎食後服 條韭白五分煎至一蓋去淖無時服 胡黄連 柴胡 青嵩各一烏樂五甘草西川芎二錢 髓甲酯香附子炒去桔梗 普濟方 前胡 烏梅谷三 主

治骨蒸出危有人患勞瘵兩年諸樂不効一日無肉味 腹痛不可忍又恐傳染移在空房候其自然經停三 覆盡力燒火不住其銳欲裂方住火開銚視之乃小 蟲一條頭目皆具已煅死如纖線樣即以示其家人 出抽約二尺長趁下瓦跳中病人知是惟物即用碗 鼻如有碍將熟問忽嚏噴一聲有紅線一條自鼻中 **校病人們仰取火低頭取瓦餅煎熟吹火屢燃屢滅** 日覺腹痛氣息將絕思肉味之美忍有人惠鷄子三

欽定四庫全書 香政飲出聖清治骨蒸腫氣每至日晚即惡寒壯熱類 地便散出危治骨蒸肌熱一切虚勞煩躁生津液 赤不下食日漸瘦 栗之於江其病即安 右細剉相和以童子小便二盛半浸一宿平旦煎至 右剉散每服三錢水一盡生薑五片煎不拘時候服 地骨皮而防風去盛甘草五麥門冬去心 香政分生地黄一葱白豆 卷二百三十六 芝

青嵩九無方治骨蒸體熱發渴寒熱宜服 兩 稀錫却傾於銅器中下樂又於糠火上煎以柳木 右以童子小便三斗於瓷甕中盛於糠火上煎令如 生搖羅書為末本人類妙令黃研爛甘草青高一動取禁曝化二一動湯浸去皮兴甘草 為生 末揕 **淳分溫二服空腹日午服一方有甘草炙一** 稀稠得所候可丸即丸如梧桐子 兩五

服 袋盛之每日空心溫童子小便下三十九日晚再

入黄九曲或治骨弦勞兩脇下有閃癖漸上攻心食以 小便赤黄宜服 不消化腹內積聚不散黃瘦久困冬痢或大便秘澀

石為末以聽醋二升入鐺中先煎令稠下樂末更煎 川大黄二兩鼈甲三兩金醋炙 大宜

次已日事 白馬 之以柳木枝攪勿住手候可丸即丸如梧桐子

支

普濟方

金厂工工厂 治骨蒸勞心煩不得眠卧山本 靈蓋丸無好治骨蒸勞顏色憔悴不思飲食四肢急 此外不得食之老小以意加減忌莧菜 空腹及晚食前以粥飲下九丸漸加至十丸以溏利 粥候熟下地黄汁一合煎煮過不計時候食之 用酸棗仁二兩水二大盆半研紋取汁下米二合養 强翕翕發熱宜服此方 下濃血爛肉為度唯得食黃飯葱煎汁下生量而已 卷二百三十六

次色可華心島 黑者服樂七日必瘥每日午時更服後九一 服以粥食下若胸前青筋出者以針刺看血色未變 右搖篩和更搖一千杵丸如梧子大一 一类并樹白皮及棘刺五七片各焼為末水淋取 惠方治骨蒸傳屍鬼氣 分同研用較飯和內如小豆大每服空心以温 一再淋如此五過即煎成霜取二两入麝 普濟方 兩 ٠,١ 一服七九日再 克 服

鱼少口匠有量 為丸如梧桐子 紙封口用大麥麵裏文火燒令麵黃熟 利為度 酒下七丸潟下勞蟲即愈如未利即加九數服之以 以熟黄瓜一 便亦黄 恵方治骨 枚頭上取破去穣納黃連末二兩却以 **入母於食後以溫水下二十九** 「 勞宜服此方 卷二百三十六 及膚乾燥心神煩熱口乾小 出聖 恵力

一欽定四車全書 野 治骨蒸極熟出本 地黄飲出直治骨落劳路血 用生地黄搖汁入薑汁少許服之以熟退為度或利 煎至三斗再濾去浑更煎令稠可丸即丸如梧桐子 則止一方入白粥内攪匀空心服 取三年桃樹一株并根打去泥土勿洗及枝葉等細 剉以水三石煮取一石 即澄濾去滓土還將樂汁 大每日空心以溫水下三十九晚食前再服 きこることと 旱

療骨蒸鬼氣出財 者住細剉相和納大釜中以猛火煎取三大斗去滓 取童子小便五大斗澄過青萬五斗八九月採带子 方圆可一尺以炭灰焼之三食項極熱洒雄黄汁 脱衣坐石上令停以衣被圍繞身勿令樂氣泄出經 石上恐大熟不可近宜著一片薄檀置石上令患人 用雄黄一两和小便一升研如粉乃取黄理石一枚 二五度暖小便用童子者住

治骨茲、由聖 欽定四庫全書 主骨蒸病小便方 盛每於服時取甘草二三兩熟多搖末以煎和搖 取猪膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新瓷器 净洗釜中乾再漏汁安釜中以微火煎可二大斗即 用天靈蓋如梳大炙令黄碎以水五升煮取二升 千好為丸空腹粥飲下二十九漸増至三十九止 服起死神劲方 卷二百三十六

五蒸湯出核九勞病宜隨各經虚實內外沒深用藥 減治之 痊去人五步 聞病人小便臭者無不瘥 日二十日以後當有蟲蚰蜒兒其蟲在身當處出俱 服之仍取中者去前後病輕者二十日病重者五十 两服中間如人行二十里服此以後每自小便即 取三歲童子小便五升煎取一大升以三匙蜜和為

欽定四庫全書 治一切男子精虚骨熱漸次積成勞然其病上焦壅熱 督那 益正氣方後常喫解骨槽勞熟方若人得此病 傷熱小便數忽時黄赤色先宜喚解上膈方次喫退 屑口乾焦下部無力兩足冷忽非時乍寒乍熱六腑 冬 右改咀以水九升煮取二升半分三服亦得以先煮 小麥水乃煮樂忌海藻松菜無美大醋一方有麥門 各二知母 黄本各二石膏五两粳米二 巻二百三十六 圭

大病者也所下之樂分毫不得令動水臟若所服樂 稍有一 枕此骨蒸之病熱毒疾在骨槽之間却因精虛不能 初骨蒸上焦氣壅利上膈方出子建萬 須戒斷酒色一二年合藥對當不輛服餌然後方得 就不可解也全該命方 主持血氣而熱毒之氣蒸鬱骨槽相次傳入臟腑成 安枕緣骨蒸勞病不同臟腑客疾易為服餌并得如 一味傷動水臟即臟腑不能載涼樂而骨槽之

治一切男子骨茲其勞氣相次傳入臟腑先次雲前面 沸便渴出食後臨卧去滓熱喫 右細杆羅為末每服二錢水一盞生薑一片同煎 漸與此去腎邪正元氣散若上 毛去 主 誰命方 其 萬 地骨皮去貝母去心各 鼈甲頭灸 卷二百三十六 黄本學沉香學前胡 一膈熱滞盛九喫雨 柴胡

治骨茲勞熱攻擊上焦面上熱燥下部無力唇口生瘡 梧桐子大每旦空心鹽湯下三十九 口無味精神不守輕喚熱物酿物即惡心思吐睡中 延溢忽肌肉带黑色宜服此方出子建為 右細研羅為末了方入麝香同研令匀細研蜜丸如 靈益既炙黄川芎 杜仲去巴戟法茯苓 地骨皮 鼈甲醋及各麝香 鼈甲既杏

ここうう 無楊 南方治骨蒸發熱 右為麤末每服五錢水二盆薑五片煎一 沸潟出食後臨即時熱服 右杵細羅為末每二銭水一 蘆根 南出方指 羌活 蔓朔子谷 麥門冬 晉南方 赤茯苓 胡黄連四 盛生薑一片同煎 橘皮各五地骨皮 一盏去浑服 盂 兩=

磐石丸 免絲散出指 **稣定匹库全書** 右為末米飲調下二錢食前服 石為散每服五錢水二盞去淖溫服 磐石火煅通旋覆花 兩乾薑 巧樂 **鬼終子酒浸五味子** 澤潟州白木 南出方指 防風 石膏 卷二百三十六 桂去皮枳實多妙 生乾地黄三 一兩厚 赤茯苓两

でこう は ここ 走馬散出鄉治骨蒸勞氣 米飲下未知漸加 石為末以桃柳枝葱白各一 右為末煉蜜和九杵三五百杵如桐子大每服五九 秦光洗電甲既當歸 大黄濕紙果 鳥頭炮去皮 柴胡兩各 普齊方 知母 握酒水童便各一盛鳥 黄連 青嵩子 孟

分定四库 全書 神 錢早晚空心服 煎下數服時時如水飲之 聽崇胡散華 陀中治大人小兒骨熱夜間如蒸甚 同煎至七分食後溫服如虛瘦即空心服補樂食 梅生薑棗各七箇煎去洋每服飲子 右為末每服二錢水一盞入地骨皮指頭大二片 只十数日見劾 土柴胡不以太焦亦 巻二百三十六 銀淨 州炙 者黄 半盆下樂末

蘭臺散 宋智方治骨 鼈甲散出衛生治男子婦人骨蒸勞疾久虚人不可服 **飲定四車全書** 黄根一两 至一蓋去淖服日進三服常救人有縣如盗汗加麻 右為麤末每服二大錢入小麥五十粒水一盞半煎 石膏為一 鼈甲酷大黄 黑香赤茯苓 當歸去乾漆炒青烟白术 甘草五錢 然勞熱骨立五心煩躁又大病後 普灣方 常山醋柴胡醋浸 生熟地黄 美 乾

地德散出衛生治骨菜肌熱解 或大小後多睡或不睡 極效 神不聚此藥取驗之 煎後地德散調服尤驗若小兒睡起不了了者此為 右同為末每服二錢以韭葉汁調下虚勞潮熱不 地骨皮與甘草多防風去以股者去 烏梅肉 內五上培燥野黄 潭又燒潭九二十遍一兩去核取亡黄二兩火煅紅投米醋 卷二百三十六 切虚煩燥渇生津 中

沙 之 四 事 全 等 七寶九出永頻渦骨菜傳尸 生肌散出衛生治骨菜退裏外潮熱甚妙 去淳服 至七分服别法有鷄豆一两 石件為末每二錢水一盞入生薑三片竹葉七葉煎 胃皮 皮川芎或人多或五 五歲當歸分荆芥穗五白芍藥一甘草 末每服三錢水一盞半鳥梅一箇煎至! 普濟方 邪氣陽病可服 圭 《溢

水下或用陽病開關散咽下無珠砂亦可 中吹乾丸如梧桐子大妹砂麝香作衣空心麥門 五升文火煮令爛乾為度以肚細切同樂爛研置風 石為細末用猪肚一箇洗淨入樂末線縫之用童便 黄連四 鈴古水類 卷二百三十六 水通五甘草 麥門冬五歲各 、鐵當歸

炎定四車全書 医病開開散出永期 便三分盆又煎七分溫服先服此起胃散一二日後 右㕮咀每三錢薑三片煎七分入無灰酒三分盞童 心下小便多疾病去也 右㕮咀每服三錢水一大益生薑二片煎至六分空 當歸 赤芍藥 白皮蜜真地骨皮多 錢製 枳殼 錢天南星 汁浸一宿焙 肉桂 告海方 ト 白芷 甘草炙谷木香

黄耆成二白术炒一白芷五人参或山藥一起胃散出永頻陰陽二候皆用 烏龍膏出永類 各五錢 右㕮咀每服三錢加木瓜煎一方加沉香茯苓甘草 不問退否無玉龍膏服之 烏梅去柴胡 貝母超以防風錢 杏仁為末 皂角六十 紫苑 生乾地黄 木香西

欽定四庫全書 玉龍膏出水類 片湯浸去黑皮猪肉剁爛如泥同皂角一處入水五 藥末為丸如梧桐子大每服二十丸空心麥門冬湯 升細操汁入童便三升無灰酒一升并熬如膏和前 右二十片去黑皮醋炙為末二十片焼灰存性二十 下甚者二十日効 青嵩子 柴胡 木香 牡蠣各五地骨皮或人参两生地 巻二百三十六 白檳榔各二鼈甲多白术 麦 赤

鼈甲湯煮去皮褐酒浸炙黄赤皆為末右加烏梅肉 文火煎至隨手爛傾入砂盆用柳木槌研爛為膏細 以清水淘去皮滓焙乾別以童便一升於銀石器內 夏七日秋冬十日和瓶中晒每日一換新者日數足 枳殼右前件末成却以杏仁五升壯者以童便浸春 **祁濾過入酥一兩薄荷自然汁合攪匀和樂用搥搖** 內從落一两 兩當歸或休砂或豆豉心二虎頭骨以開 酒 两炙

治骨蒸出本 **欽定四庫全書** 多最清隔日又服一劑百日不得食肉 井花水類服令盡服記量性飲酒令醉仍須喫水能 五百下丸如梧桐子大空心湯下十五九加至三十 用桃仁一百二十枚去皮雙仁留火杵和為丸平旦 退進食安計面有血色乃樂行也當動勿怠忌覚英 九如覺熟減九數服熟少還添加減經月日諸證皆 白粥冷水生血雀鴿等物 長二百三十七 里

治骨蒸出本 治骨蒸出本 治骨蒸熟劳鬼氣出本 用生地黄一升搖取汁三度搖殺汁盡分再服者利 食之 用生地黄汁二合煮白粥熟入地黄汁攪令匀空心 即減之以身凉為度 石取青蒿子為末酒服方寸七蹇

钦定四車全書 論曰骨蒸煩渴者荣衛乏竭肌肉消瘦虚陽之 枯焦煩渴引飲 一令津液枯燥胸中煩熱咽嗌焦乾故煩渴而引飲 阿膠炒 骨蒸煩渴附論 總録 治骨菜虚勞熱氣上薰咽監焦乾津 門熱勞類 .普湾方 里上

白樂子 防己 枚五 石膏碎麻黄去苗黄芩 黄連去龍膽 醋去 矣 甘草 多梗桔炒貝母法知母焙款冬花 六味剉如麻豆大每服五錢以水一盆半煎 栝樓根 生乾地黄焙葛根 枳殼去粮地骨皮 馬兜鈴 炒 杏仁炒各一兩 檳隔紙杏仁湯浸去皮头雙檳 巻二百三十六 法黑栀子仁 大黄炒桑根白皮 柴胡去秦并 百合 麥門冬去 鼈甲

飲定四車全書 人 地骨皮湯出直治虚勞潮熱骨蒸壯熱 竹葉飲 麥各少許煎至七分去津溫服一方有川芎五錢 方無小麥潮熱甚加些大黄微利之 **坐八分去滓食後卧時温服** 石麤搖篩每服二錢水一蓋入烏梅生薑桃柳枝小 地骨皮洗秦艽洗柴胡 福職 甘草吳枳殼去猿麵炒各 療骨然唇口乾燥欲得飲水止渴 普濟方 知母生當歸各五鼈 里

麥門冬湯 藻松菜 右切以水五升煮取二升半分温三服忌羊肉锡海 靈搖篩每服五錢水一盞半入苦竹葉三片煎至 甘草文到各 麥門冬去心培黄芩去黑 崇胡去升麻 滑湯 盡洗 竹葉也麥門冬去心大棗頭時甘草至兩半夏 令粳米五生量三 治骨滋煩燉燉發熱骨節疼瘦口乾煩渴 卷二百三十 飲定四車全書 麥門冬散出聖治骨蒸口舌乾燥欲得飲水宜服 葛根湯 禁煎至一盛去淖分温二服空腹食後各 石麤搖篩每服五錢水一盆半入盧根五根竹葉 葛根坐赤花 盛去津温分二 錢人 治骨菜煩渴嘔不下食四肢發熱 去心悟地骨皮一兩五錢地骨皮 令去黑甘草 與麥門冬去 一服空腹食後各 普濟方 兩黃耆里分 聖

根湯 温服 粳米五十粒竹葉二七片煎至六分去淖不計時候 石麤搖羅為散每服四錢以水一中盈入生薑半 葛根炙一 兩 燃搖篩每用五錢水一盞半竹葉三片生薑根一 微赤 對都數根分一 兩多級數根三 治骨蒸熱煩渴嘔逆不下食 赤茯苓去 寒門冬去心培各甘草

麥門冬飲一名构治骨茶唇口乾燥止渴 飲定四車全書 T 右細剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至小麥熟 右為散每服一錢沸湯調下食後臨即服 **枚煎至一盏去淖分溫二服空腹食後各** 去浑温服食後日二 秦光去苗崇胡去甘草 製鳥梅取肉焙 麥門冬三两枸杞根五小麥 治骨蒸潮熱煩渴引飲不思飲食 ·普濟方 器

麥門冬湯 又方療骨蒸唇乾口燥欲得飲水止渴 校去核竹葉三片粳米四十九粒煎至七分去漳空 右以水七升煮取四升去滓以溫三合稍飲之佳 心温服日午夜卧再服 右麤搖節每服三錢水一盞入生薑半分拍碎棗三 麥門冬培心甘草矣對各半夏湯洗去滑 大烏梅二十石膏鄉果 治骨蒸唇口乾燥止渴 卷二百三十六 跃定四車全書 麥門冬散 天門冬散 右為散每服四錢水一盏薑三片煎六分去滓食後服 門冬 赤川 举分知母 分栀子仁 樂三枳殼 恵方治骨蒸虚煩瑜燉發熱骨節發疼宜服 惠方治骨蒸心肺煩熱喘息氣促漸加羸瘦 去心培桑根白皮一两五錢桑根白皮 去心培 前胡三分赤茯苓而甘草一兩五錢前胡三分赤茯苓而甘草 きニョミト 一分柴胡 去狼川升麻山赤茯苓山黄 好白前盛柴胡 , 两地骨皮三 去苗甘草 聖 赤两剉炙 去酶杏

瀬肝丸 煎至六分去浑每於食後溫服 右搖麤羅為散每服四錢以水 獭 兩子苓 惠方治骨蒸煩熟日月久遠漸加羸瘦宜服出聖治骨蒸煩熟日月久遠漸加羸瘦宜服 **銭天靈蓋** 不煉蜜和搖三五百杵丸如桐子每服以童便 处仁姓 炒微二分湯浸去 で耐地骨皮 黄寒柴胡 黄皮 **令两** 焦筌 兴桑根白皮 一兩ノ 錢去苗立参两知母 黄川大黄呼微炒 八兩木通 中盛入生薑生 剉 兩桔梗 栢樹香脂 ~大麻 蘆一 頭兩 去

钦定四車全書 及 蘆根散出聖治骨蒸煩熱多渴不能飲食宜服 亦茯苓散 恵方 煎至六分去潭每於食後溫服 右搖麤羅為散每服四錢以水一中蓋入生薑里 浸或一合經宿去浑下三十九日再服若有下利減服 举三地骨皮而甘草 思亦 致人 兩 雨赤茯苓 知知母 · 普濟方 两麥門冬一 四頭 旅縣根 去一心两 四十六 焙五

能飲食 升麻散出聖治骨蒸惡心煩熱眼目昏澀肢節痠疼不 煎至六分去淳不計時候溫服 右搖麤羅為散每服三錢以水一中蓋入生薑半分 乾地黄一两赤芍樂一地骨皮少麥門冬氏两五 福黃去 川升麻一黄連二兩枳殼 赤茯苓而柴胡或去站地骨皮三鼈甲一 露或川朴硝 兩 微黄去根栀子仁分生一两处炒栀子仁三生 土一醋兩 炙五 微錢

欽定四庫全書 人 一聖散出聖治骨蒸勞氣煩熱四肢無力夜虚汗唇口 乾焦面無血色日漸羸瘦丈夫婦人并宜服 卧各一服 煎至六分去浑每於食後溫服 右搖麤羅為散每服三錢以水一中盈入生薑半分 右為細散每服用生薑酒調一錢每日早辰日午臨 焙甘草兩 胡黄連一柴胡二兩點甲二两 色二百三十六普瀬方 四七

知母散 燥宜服 後以溫樂水下三十九 右為末煉蜜和搖三二百杵九如梧桐子大每服食 角屑 頭鼈甲一兩醋塗 惠方治骨蒸煩熱口舌乾燥多渴少思飲食四 恵力治骨蒸煩熱四肢痠痛日晚頰赤口舌乾 厳鞋 子苓格三柴胡 福湖川芒硝-龍膽去蘆知母 兩 《去苗前胡 去 蘆兩

次定四事全島 一人 熟傳屍方見屍注門係 一多散連丸 治骨蒸消渴消中 肢羸瘦日晚烟赤宜服 石搖麤羅為散每服三錢以水一中益煎至六分去 龍齒一川芒硝二甘草炙微赤矢母兩共武去的地骨皮如犀角骨的白鲜 不計時候溫服 去的地骨皮 、普濟方 門傅 熱中渴利心熱風虚 哭

鼈甲丸 動憂思氣結呼吸風冷其疾遂作起於脇下臍腹兩邊 白りと 如臂之横不可按抑妨害飲食總積而痛故謂之骨然 不能銷鐵留滞肠筋遂成痼疾塊硬不消或因飲食傷 夫骨蒸之人肌膚瘦悴榮衛虚弱真陽內耗所飲之水 鼈甲去裙襉 治骨蒸脇下 兩桂皮 土瓜根培京三稜 卷二百三十六 **疹癖及婦人月水不通**

能 **炎定四車全書** 下食羸瘦無力宜服 右為末和匀煉蜜丸如梧桐子每服二十九食後桃 仁湯送下 珀各二桃仁湯浸去皮 水香或鼈甲 惠方治骨蒸腹中 微炒陳桶皮 黄兩 去塗 普濟方 福醋 **疫癖按之隱手四肢疼痛不** 三人 雙光 两分、 五 数 各 禮京 三 去白旗焙煮大 二稜炮對赤芍 訶烈勒煨對琥 **微五** 炒錢 桔

煎至六分去滓每於食前溫服 石搖麤羅為散每服三錢以水一 鼈甲 **前科勒三分規京三稜** 榍 頭去檳榔 柳上赤芍樂少木香少赤茯苓 恵力治骨茶 恵方治骨蒸腹中出聖治骨 黄 黄两 去醋 一冊柴胡 福逢 礀 炙 卷二百三十 **蹇癖脇下姑痛漸加瘦** 去苗郁李仁皮失微一两那 下妨痛漸加瘦劣不欲飲 煨 **判桃仁火雙** 中盆入生薑尘 兩桔梗 仁浸 炒湯 黄去 炒浸 蘆 去 頭两 皮 去

飲定四車全書 人 食宜服 煎至六分去浑每服於食前溫服尽莧菜 石搖廳羅為散每服四錢以水一中蓋入生薑出 赤芍藥兩 川大黄一兩對木香鐵柴胡 藭 於 崇胡 恵方治骨蒸蹇癖脇下妨問肢節疼痛宜服 蘆頭去當歸 去站鱉甲 き二百三十 炒河梨 福欄川大黄 去苗赤芍藥五一兩赤芍藥三 平 碎一微两 炒剉

柴胡散 煎至六分去浑每於食前溫服 石搖羅碎為散每服三錢以水一中盈入生薑里 柴胡 微仁 做黄 鼈甲一两塗醋之野用皮枳實 以微黄甘安 惠方治骨蒸遊癖體瘦食少宜服 去苗赤茯苓 碎微炒艺 散每服三錢以水 · 鐵柱心或京三稜 硼炙 微五黄銭 **微赤對白术分积殼** 五錢炙白术三枳殼 中盛入生薑半 及桃仁 皮两 炮 火湯 剉兩 雙浸 兩

飲定四車全書 | 嬴瘦 前以粥飲下二十九 **煎至六分去淖每於食前服** 右為末煉蜜和搖三二百杆九如梧桐子大每於食 訶梨勒三分煨赤芍藥少桔梗三分去川大黄 去裙欄枳殼做黄去粮炙令黄枳殼一兩麸炒 炒 防凝 藍頭 芎藭分人参 藍頭 鼈甲 童醋到碎防凝三分去芎藭三人参三分去鼈甲一兩 惠方治骨蒸透癣氣攻腹脇四肢疼痛少力 普濟方 至 兩

鼈甲九出聖治骨蒸腹內癖疫按之隱痛不能下食贏 木香湯 弱無が 石麤搖篩每五錢以水一盞半煎至一盞去淖分溫 服空腹食後各 鼈甲去福欄雕大香二京三稜煨到一分 木香 皮 訶梨勒炮去當歸切焙各 治骨蒸勞腹中 檳榔州人参西 一芍藥 冷痛漸至羸弱 桔梗坐赤

松脂丸 飲定四車全書 人 右搖羅七味為末郁李仁再研匀煉蜜丸如梧桐子 拜諸癩疾惡瘡疥癣等此樂服之斷絕根源 八每服三十丸橘皮湯食前下 兩去 五皮 砥研 松指二十角以桑宏灰汁鎮去白茯苓去黑 治傳尸骨蒸積癖冷氣及腰脚衰弱身體 續斷格半白蜜 白焙去 **忽大米沿浸切檳榔到二郁李** · 普濟方::.. 牛酥 麥門冬去心 皮 風 白

蒼术丸 至五十九 如梧桐子大以溫酒或米飲下二十九日二服漸 下松脂候烊乾即下樂末以竹枝攪勿住可九即 右搖羅為細末先以五味煉蜜烊去潭次下牛酥次 地黄焙各 蒼术 治骨蒸腹中 訶私勒皮各一 两陳橋皮湯浸去木香 人湯浸去白龍骨 老二百三十六 **疫癖妨痛煎下利日夜數十** 一切两焙

飲定四車全書 鼈甲丸 粘食 漸加至三十九日再服不利莧菜生菜熟題喬麥蒜 食前下日再服 石為末煉蜜和九如梧桐子大以酒飲下二十九 石為末煉審和九如梧桐子大每服三十九人參湯 勒皮熬枳實多防風分六 鼈甲炙芍樂 療疹癖氣心松骨蒸熱層風 蝮蛇脯 多大黄谷六人参 普濟方 至 訶梨 漸

鼈甲 力不欲飲食宜服 前以粥飲下三十九 石為末煉蜜和搖三二百杵丸如梧桐子 胡 皮根殼 恵方治骨 去 甲 微黄去裙襴一兩塗醋炙 笛兩 微黄去 一两麸 老二 百三十六 **癣氣攻腹脇疼痛四肢羸瘦** 粮白水或川大黄 : 一頭去赤 妨痛漸加羸瘦 妙两 對柴

飲定四庫全書 七聖散 皆治之 中雷鳴時多泄利飲食無味行歩不能凢五臟虚勞 背膊瘦重至夜更甚四肢消瘦顏色姜黄兩膝疼腹 右麤搖節每服五錢水一盞半煎至一盞去滓分溫 服空腹各 入腹松芍藥 訶梨勒皮各一 治骨蒸積癖鬼氣症忤及男女虚損手足 人 各一桃仁 别研一两五线 糸晋 済す 孟 仁錢各

度取出樂別焙乾搖羅為散每服 并水半碗同蓋覆勿令透氣候碗內米并鷄爛熟為 以銀石器盛新布罩坐於甑中蒸甑一邊用椀盛米 右除鷄外各剉如麻豆大和匀入在鷄腹內却縫 ,服其鷄劈碎掺少鹽令患人恣意食之飽即止良 蜀椒 人参 口者一分生地黄 陳橘皮湯浸去 間 ・隻 竅如 去食 腸法 两皮肥-者升 ~極淨并 生薑去皮黄耆ツ 一銭米飲調 日 剉

欽定四庫全書 人 冐風寒 服以一分內湯中服忌猪肉粘食生冷莧菜海苔 右切以水七升煮取二升八合去滓分作二服又用 **痠癖鬼氣疰件骨煞秘驗力** 八厚衣被覆取汗汗多即以牡礪燒搖為粉傳之勿 -黄犀角生末珠砂麝香各一分細研分為三分每 两丁香二十七枚 大黄別漬湯欲成鼈甲炙勾藤 き二百三十六 升麻 圭

陳添九 浙無力 菜 煎橘皮湯下三十九 右為末煉蜜和搖三三百杵九如梧桐子上 防蒸 竹微炒京三稜 惠方治骨花 八兩艦甲 治傅 一飛尸疰氣塊積氣逆上喘水病脚氣 令一 黄两 然 遊游按之隱手不能下食癩病 炮剉桃仁火隻一两桃仁一兩 去塗 湖甘草 Ð 兩

飲定四車全書 型 鬼疰蟲毒宿食不消腹中如覆枉或九蟲婦人帯下赤 復時候下陳添大黄薏苡仁等末更煮一復時候樂 白及惡瘡腹大羸瘦黃疸諸疾延年養性黑鬚髮 洋後用銀石器盛重湯煮之以竹箆子不住手攬一 可丸如梧桐子大置於不津器中密封遇有患者經 右以清酒先和蔓青子末煎不住手攪至半日許憑 莫青子為末 陳添二升次鄉大黃為本意改仁為末無及酒五 というとトラ 平六

骨汗淋方出聖治骨蒸癖積諸疾令絕根源沐浴方 宿勿食明日清旦空心温酒下十九年高或冷疾者 右以水一石二十煮取七斗 勿疑 加至十五丸服之百日後鬚髮如漆積年瘡痕皆滅 初服四五日至七日內寫出宿食或魚黏膿血療物 枯朽骨趋碎三斗不爛棘藏刺三朔猩並葉根較 斗剉 濾去滓内大鹽三升

钦定四車全書 ! 鹽銷鎔盡於大盆中或瓷器中盛候溫煖得所令患 樂力一方無朔雚有桃枝一方無枯朽骨 拭體乾或多汗以白米粉傅之只於客室中静心或 者浸之瓷盆四畔用馬糞火煨媛令湯長溫勿使稍 冷覺寒令進稀熱粥每進身體可停一炊時出湯時 秋冬停三五日夏一二日再媛用若患瘙痒者湯內 坐或卧勿令衝風毒三日一次浴三次止其樂湯春 入芒硝白礬末各一大升佳浸時須至頻已下得全 糸二 すミトト 圣

柴胡茯苓湯 治骨蒸積癖瘦病 芒硝六分取利熱除之後每三日服一劑獲後每月 不用枳實 右切以水七升煮取二升半分為三服積熱不歇加 割肥白終身永除忌桃李雀內大醋一方用 积殼 蒜去皮七姓黄杏核 柴胡四茯苓 療疫癖氣壯熟無效久為骨蒸 白术 枳實三两

飲定四車全書 八 治勞損羸瘦風虚注氣積癖冷氣心痛及骨蒸 又浸浴湯方 為驗 用桃仁去皮火雙仁一千二百枚細研以好酒五升 般根並以水八九斗同麦取五六斗去漳加鹽二大 斗浸之亦同煎法 取桃柳蒴灌李株四般枝葉各一大斗冬月只用諸 右研爛拌匀以清酒和服少時十指頭上當有毛出 普齊方 天!!

不止多痰或如膿涕或吐之不能出時發寒熱肌體贏 夫骨蒸肺疾者榮衛虛損蘊熱薰蒸三焦傳播育膜使 肺熱葉焦發為肺養其證咯強膿血虚淌短氣咳嗽 取汁更以一升再和研濾盡白汁以乾瓷器盛客卦 以重湯慢火煮一復時候每服一匙用酒或米飲調 先用二升和研濾取汁次入二升再研令極爛又濾 骨蒸肺痿附論

次定四車全書 惠方治骨落肺痿咳嗽胸 温泉機杏 一般炒百合 去苗桑根白皮對甘草 外桔梗 散每服四錢以水一中盆入生薑 **盧五** 頭錢 然 普濟方 胡 超湯 炒浸 微去 去 苗麥門冬去心鼈甲 裁烏梅肉 黄皮 微赤則 提子仁 膈痛舌澀口乾宜 火 麦 微三 服 銭五

茯苓湯 至六分去淳不計時候溫服忌莧菜 五十粒桃柳枝各 石對為散每服五錢以水 白茯苓去黑人多 夢寐恍惚吐血身體疼重或痒多生瘡 癣并治脚氣 三桂去處防風去防已各 治骨蒸肺養心松戰慄煩熱善忘精神 各四两地骨皮去粮麸炒地骨皮 握長七寸葱韭白各七寸同煎 老二百三十分 麥門冬出心獨活去蘆檳 一盏半入生薑半分切碎 兩枯梗炒甘草

飲定四車全書 白前散 東二枚劈破煎取八分去潭頓服早晚食後各 銀器煎更妙 右搖蟲羅為散每服三錢以水一中盖入生薑半 東三枚煎至六分去浑不計 燥麥門冬 麻仁全桂心 越赤茯苓而黄耆 些 白前三甘草服恭對人多蘆頭生乾地黃雨 惠方治骨落肺痿心中煩渴痰嗽不止宜服 去 心培桑根白皮到分 卷二 百三十六 時候溫服忌炙傳油朦 一分阿膠中 卒

叔勞散此危治心腎俱虚勞吸時服三四升遇夜發熱 熱過即盗汗四肢倦怠體瘦恍惚夜夢不祥啦中有 血名肺瘘 右為麤散入生薑棗子煎至七分去浑每服四錢 白芍樂五黄者去盛甘草多南珍去蘆一方 苓去熟地黄 焙當歸去五味子 恵か治骨蒸肺痿煩躁四肢疼痛不能飲食 料炒成珠子二兩揀明淨者 半夏麴 白孜 阿

欽定四庫全書 柴胡散出聖治骨蒸肺養咳嗽睡涎心神煩熱不欲飲 服 至六分去津不計時候溫服 食宜服 右搖節為散每服四錢以水一中蓋入生薑半 柴胡 知母 地骨皮两甘草 外陳橋 去苗麥門冬一兩麥門冬 卷二百三十六 一两去黄芩 粮焙蘆根一 兴分柴胡二 西 一两麥門冬 圶 两 去一心雨 白湯

蘆根散出聖治骨煞煩熱肺痿手足煩熱多渴或不能 食宜服 煎至六分去滓不計時候溫服骨蒸小柴胡湯極佳 右搖廳羅為散每服三錢以水一中蓋入生薑坐 蘆根 当 焙穰 蘆頭 赤茯苓 两五鐵去赤茯苓三 以子苓分地骨皮 一兩赤茯苓 蘆頭 甘草 兩 陳橋皮 對三分半夏 通去滑 去白粮焙麥門 對桑 桔 两

欽定四庫全書 地黄煎出聖治骨然肺痿咳吸咽喉胸膈乾痛宜服 至六分去漳不計時候溫服 服不計時候以溫粥飲調下一茶匙 右搖篩為散每服四錢以水一中盛入生薑半分煎 两門膠三兩推碎炒生薑一薯預二兩酥四家 生地黄汁益 杏仁仁姓 以 微黄細研 黄牛髓 根白皮三 處用石鍋子內以慢火熬成膏沒於瓷器中 卷二百三十六普濟方 空

柴胡散出聖治骨蒸肺痿咳嗽寒熱多涕宜服 煎至六分去淖不計時候服 右搖麤羅為散每服四錢以水一中盡入生薑生 未 對 崇胡 生乾地黄而桑根白皮 兩 苗村草 惠方治骨蒸寒熱肺痿喘促宜服 去的麥門冬 一两 貝 剉 心兩 訶梨勒一两 焙五 餞 黄州 参五頭 甘草 去

麥門冬散出聖治骨蒸肺痿咽中乾燥宜服 欽定四庫全書 吴 煎至六分去淖不計時候溫服 煎至六分去津不計時候溫服粥飲調下一茶匙 石搖麤羅為散每服四錢以水一中蓋入生薑半 右搖麤羅為散每服四錢以水一中盛入生薑半 射干如川升麻 麥門冬心時去甘草微赤對黄送三分赤茯苓 桃仁吳雙仁妙微黃態用做黄去裙 卷二百三十六 襴炙 笙 兩

稠 東三枚煎至六分去潭不計時候溫服 飲食 右搖蟲羅為散每服三錢以水一中蓋入生薑半 粘 赤茯苓而枳殼令黄去粮紫苑一兩去 甜夢薩一两微桑根白皮里 陳桶皮去白狼 惠方治骨落肺痿心胸滿悶咳嗽延睡不欲 惠方治骨然肺痿咳嗽上氣不得眠計涕 焙浸

欽定四庫全書 题 天門冬散出聖治骨然肺養咳嗽心神煩熱頰赤口乾 不欲飲食宜服 煎至六分去滓不計時候溫服 右搖麤羅為散每服四錢以水一中蓋入生薑半 土生乾地黄而甘草 天門冬一兩旋覆花越桑根白皮里分紫苑五磁 蘆頭 旋覆花五 形茯苓二甘草五鐵炙紫苑一两去白前三前胡 とこち三十六 普瀬方 赤分 六点

盧根飲子 去八九里畫三服夜二服取汁忌酥物未瘥更作 至六分去浡不計時候溫服 右搖篩為散每服四錢以水一中盛入生薑平分煎 右切以水二斗麦取八升放去浑分温五服服别相 無服其人或胸留寒或惡寒及虚服并痛者加吳 蘆根切前麥門冬出地骨白皮各十生薑皮切 茯苓各五 療骨滋肺痿煩燥不能飲食心煩多渴

白前散 當歸黃耆湯 欽定四庫全書 一 **棗二枚劈破同煎八分去淖食前服** 石麤搖篩每服五錢水一盞半生薑如一 が八两 白前 黄耆当當歸好人参 治骨弦肺痿咳嗽涕睡如膠胸背煩熱 日 N 巻二百三十六 至 発根白皮災來門冬去心培各旋覆水 治骨茲肺痿 桔梗 東大拍破

地黄汁各三 白蜜 止貯容器中遇食養中着一兩匙日三四服 治骨滋肺痿咳嗽咯膿血病重者 炙 兩剉 (煎不住手攪熬至四分波

飲定四車全書 两 門冬湯 片煎至一盛去津分温二服空腹食後各 漸羸瘦 温服二合 石除銀外細剉入酒以一 石廳搖節每服五錢水一萬半入蘆根三至竹葉三 甘草两炙 天門冬去心焙升麻 治骨炎 **然肺痿咳嗽氣逆喘急唾不出唇漸** を浴方三十二 黄芩去黑前胡去蓝頭 升資取半升去洋每食 奕 錢各

甘草散出聖治骨藝肺養心中煩熱宜服 治肺痿骨蒸咳嗽上喘呀呷有聲方 右為末煉盛丸如梧桐子大每服七九空心米飲下 漳不計時候溫服 漸加至十五九以知為度 右搖魔羅為散每服三錢以水一中蓋煎至六分去 青羚羊肺一具黄熟去 甘草他赤則黄芩兩麥門冬心焙 筋提若子果酷沒日

飲定四車全書 八 秦光扶贏湯出醫力治肺養骨蒸已成勞嗽或寒或熱 煎七分去滓食後温服 石吹咀每服四錢水一盏畫五片烏梅大東各 烟渴類 本門骨蒸 聲 居及體虚自汗四肢 怠情不美飲食 地骨皮五歲半 柴胡二两人 人参盖鼈甲米醋秦艽 **然肺痿四肢煩熱不能食口乾渴** 夏湯洗紫乾茸 《普齊丁 5 :- + 甘草 當歸洗焙各 坌 '各 兩

满問背膊煩疼目睛不明四肢無力寐卧不安脊督急 驚悸有時咳嗽肠助虚脹大腸微利鼻口乾燥常多粘 時已後即四體微熱面類赤黃喜見人過常懷忿怒以 痛膝腔痰疼多卧少起狀如伴病每早晨如無病者午 ·映漸漸贏瘦飲食日減以至死在須里精神亦爽智其 夫骨落羸瘦不問男女皆因血氣不調五勞七傷心胸 稱意即大項急行即脚弱夜卧盗汗夢與鬼交時或 骨蒸羸瘦附論

柴胡丸 欽定四庫全書 證也 柴胡去胡黄連 今去黑地骨皮 肌膚日漸黃瘦 龍膽 两五銭 息二百三十八 普瀬方 生乾地黄 對龍齒 剉二 入兩 樂別

生犀角散氏方治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱 心熟水送下 石為末拌匀煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空 汗惡心煩躁及大病瘥後毒不解 右對散每服三錢陳青蒿 犀角發地骨皮 胡舞茯苓去赤芍藥 蓝髓甲聚知母各等大黄 煨 秦艽盖麥門冬去枳殼機去柴 桑白皮去黄芒 一根煎桃枝亦可及治 民去墓

欽定四庫全書 湯下 瘧疾有痰加半夏熱輕去大黄加黄芩 然子有沒別据獨活去蘆相子仁两各山菜杏仁湯沒去皮火木香 麻子仁研車前子青高四兩童子小便龍船 秦光土 黄芩 ·煉蜜和九如梧桐子 治骨蒸勞體瘦咳嗽氣急者日漸枯疼 长二百三十六普解方 △每服三十九食前 究

右除煎外七味搖研為末用蓝母草煎和丸如梧 了大空心烏梅湯下三十九漸加至四十九初服若 至便 炒去 搖別 研皮 為酒 五火 青蒿半脚桃枝 就依法服服後便以四五匙軟 去曲丹砂 甘草食料麝香研五桃 上三味細一尺長者 摅 以握 仁乾枝小已

於定四車全書 · 龍膽丸 發 飯壓之 飲下二十九日二服微利為度一方為散飲服方 右為末拌匀煉蜜丸如梧桐子大每日空心食前米 龍膳 錢各 吳黃孝太黑芍藥 恵か治骨な 五 黄連去鬚各梔子去皮苦参一方無 蒸羸瘦煩悶短氣喘息臭脹日晚節 、音楽方 青稻子 枯樓根 丰 芒硝明

治骨節間積熱漸成黃瘦 用大黄四錢童便五合煎至四合空心分作二服 縣湯 右麤搖節每服五錢水一盞半煎至一盞去滓分溫 七名龍膽散 服空心食後各 芍藥 地骨皮分一柴胡 兩當歸切焙鼈甲酷浸炙白术 治骨蒸羸瘦背膊煩疼頭痛寒熱不能下 出本 草 去苗甘草五銭石膏碎 兩

瀕肝丸 欽定四庫全書一人 乾壯熱 下二十九日二服一方瀬肝六分松脂甘草各五分 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服空腹以童子小便 方用枳實 分甘草炙對 行四五里再服 瀬肝及一兩犀角 動前胡夷 盖升麻る 治骨蒸羸瘦日晚即顏色不定手足痰疼 **柘樹上脂** シニョミトと 普海方 方用松脂天靈蓋所炙研五分一天靈蓋酥炙 芏 枳殼 三黄穰去

龍膽丸 地骨皮湯 右八味搖羅為末煉蜜和九如梧桐子大粥飲! 生慈麪韭炙肉魚粘食陳臭等物 **犀角等五味各四分以小便浸豉汁下忌海藻浆** 五九空心夜卧各一 龍膽 **縣厚者去白芍藥** 治骨蒸羸瘦經久不瘥邪熱留連 名七味地骨 分黃連縣黃芩之黑人參 以知為度 甘草久各 皮治骨茶羸瘦少力或熱力 兩 梔子仁

地骨皮散出醫方治骨蒸壮熱肌肉消瘦少力多困夜 くこうう 盗汗 右七味麤搖羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二 十九食前人参湯下日二服 地骨皮 地骨皮 脾痛口乾小便赤黄 一兩柴胡西五錢石膏碎三两 樂五歲桑根白皮 柴胡 普溶力 枳殼 五剉 知母 兩茅根 七十二 當歸 五一鐵兩

积殼丸 動反匹厚全書 右六味搖羅為末和匀煉蜜為九如梧桐子大每服 三片烏梅一箇煎服 右等分為末每服五錢水一盏桃柳枝頭各七箇薑 二十九食前米飲送下 鼈甲醋炙 枳殼去熟麸炒白木 兩杏仁炒一兩五錢 治骨蒸勞瘦飲食不思 黄 卷二百三十六 甘草 地骨皮

柴胡湯 た己丁豆 盗汗 名一 頻 甲 服 去裙襴 /II.m. 實鑑 治骨蒸肌肉消瘦 柴胡麻 普濟方 知母 最一大人 **更頰赤困倦** 脚臨

計空

心 芏 痿門

青萬丸 生地黄飲 金河四月至 右四味先以小便一斗麦青蒿至五升放去津即 酒下日晚再服漸加至三十九 餘樂候成膏可丸如梧桐子大每服十五九空心溫 亦不食日漸羸瘦 仁炒黄研去皮火雙去皮火雙一兩天靈盖為末一兩桃仁湯浸青萬切細阿魏別研天靈盖達醋炙黄桃仁一升 治骨蒸羸瘦 治骨蒸及脚氣每至晚間增寒壮熟面類 卷二百三十六 飲定四車全書 人 治丈夫婦人勞瘦 治骨蒸熟積漸黃瘦 治骨蒸勞瘦方見食治 微煎三四沸去滓食前分两服如人行四五里再服 右将黄連四分碎切以童子小便用三大合浸經宿 右四味同煎至半升去滓温分三服相去一 生地黃細切甘草矣對懲白細切童子小便 普濟方 類門

治諸結節筋骨煩 服之 温湯吞下二十九 右搖為末每日取小便三合甘草末一錢攪令為散 去浑入器中熬成膏丸如梧桐子大空心服臨卧以 石用青嵩細剉水三斗童子小便五升同煎二升坐 卷二百三十七 钦定四車全書 麥門冬去心一兩石膏一兩五錢 紫苑去苗桑根白皮炙桔梗炒續斷各一 天門冬去心焙三桑根白皮炒白茯苓去黑皮 且合甘草與五味子兩一生乾地黃一兩五歲 大煎至一盏去浑食後溫服良久再服若熟甚加 恵方治傳戶骨蒸復連確殊肺氣咳嗽一名紫 麤搖篩每服五銭以水一盏半入青竹茹弹 惠方治骨蒸勞氣潤心肺止咳嗽 普灣方 1 一两赤小

右六味搖雅為末煉蜜為九如弹子 晋濟方卷二百三十六 雙仁裁妙 甘草炙貝母去 放如東針者良打碎的不用方解石者以 **嚥煎麥門冬湯嚼下亦得不拘時候服** 良力及久敢不愈者常服直至取功為出經驗及人敢不愈者常服直至取功為 |如輕温湯調服日夜三四服之 一心两炒 甘草兩 大每服一 綿